· 短篇论著 ·

肾病型胱氨酸病一例报告并文献复习

袁博* 周文连

石河子大学第一附属医院儿科 (新疆 石河子 832000)

【摘要】目的 回顾性分析1例确诊肾病型胱氨酸病(nephrotic cystine disease)患儿的诊疗过程以及随访情况,提高临床医师对该病的认识,减少漏诊及误诊。**方法** 结合文献分析2022年1月新疆石河子大学第一附属医院儿科收治的1例肾病型胱氨酸病患儿的临床资料。**结果** 患儿,男,1岁8月,以肾小管性酸中毒为首发表现,基于家系的外显子组基因检测发现基因CTNS杂合变异:c.329+2T>C, c.582C>G(p.Tyr194Ter),并通过一代测序验证。基于ACMG指南该变异可被判定为可能致病(likely pathogenic)。**结论** 对于肾小管酸中毒并伴有生长发育落后的患儿,应尽早行CTNS基因检测以明确诊断。

【关键词】 肾病型胱氨酸病; 临床表现; CTNS基因; 治疗

【中图分类号】 R320.34

【文献标识码】 A

DOI:10.3969/j.issn.1009-3257.2023.09.005

Nephrotic Cystine Disease: A Case Report And Literature Review

YUAN Bo*, ZHOU Wen-lian.

The First Affiliated Hospital of Shihezi University, Shihezi 832000, Xinjiang, China

Abstract: Objective To retrospectively analyze the diagnosis, treatment, and follow-up of a confirmed child with nephrotic cystine disease, in order to improve clinical physicians' understanding of the disease and reduce missed diagnosis and misdiagnosis. **Method** Based on literature analysis, the clinical data of a child with nephrotic cystine disease admitted to the Pediatric Department of the First Affiliated Hospital of Xinjiang Shihezi University in January 2022 were analyzed. **Result** The patient, male, aged 1 year and 8 months, presented with renal tubular acidosis as the initial manifestation. Based on the exome gene testing of the family, a heterozygous variation in the gene CTNS was found: c.329+2T>C, c.582C>G (p.Tyr194Ter), which was confirmed through first-generation sequencing. Based on the ACMG guidelines, this mutation can be determined as potentially pathogenic. **Conclusion** For children with renal tubular acidosis accompanied by delayed growth and development, CTNS gene testing should be performed as early as possible to clarify the diagnosis.

Keywords: Nephrotic Cystine Disease; Clinical Manifestation; CTNS Gene; Treatment

胱氨酸病(cystinosis)是一种罕见的单基因常染色体隐性遗传病,其病因是编码溶酶体膜特异性胱氨酸蛋白转运体的CTNS基因发生突变,该基因位于染色体17p13上,突变可引起胱氨酸转运障碍,导致胱氨酸在多器官积累,造成多器官功能障碍,其中肾脏是最易被损害的脏器^[1]。根据发病的年龄、临床表现和疾病的严重程度,可分为三种不同的表型:婴儿型(90%)、青少年肾病型(5%)和非肾病型眼型(5%)。在婴儿肾病型胱氨酸病中,大多数患者在早年表现为肾性范可尼综合征。与此同时,肾小球功能障碍发生,如果不及时治疗,肾功能在前十年内逐渐下降,走向终末期肾病。本研究回顾性分析1例确诊肾病型胱氨酸病患儿的诊疗过程以及随访情况,提高临床医师对该病的认识,减少漏诊及误诊。本研究通过石河子大学医学院第一附属医院科技伦理委员会审批,伦理审批编号:KJ2023-006-01。

1 临床资料及诊疗经过

患儿,男,1岁8月,哈萨克族,因“多饮、多尿2周”由沙湾市人民医院转诊至石河子大学医学院第一附属医院儿科。患儿为G1P1,足月剖宫产,出身体重3600g,无窒息缺氧史,孕母身体健康,生后混合喂养,5月添加辅食,生长发育方面,3月抬头,6月会坐,13月会走,智力发育与同龄儿相同;父母非近亲婚配,否认家族遗传病史;近2周自觉患儿多饮、多尿,无口干、体重下降,无呕吐及腹泻,无头晕、乏力,无发热及惊厥,就诊于当地医院考虑“糖尿病酮症酸中毒?电解质紊乱”,予以纠酸、纠正电解质紊乱后效果欠佳,转诊至我院。

入院查体:体重12kg 身高90cm,神志清,精神烦躁,皮肤及口唇干燥,前囟1.5cm*1.5cm,鸡胸,肋骨串珠样改变;呼吸深大,约50次/分,双肺呼吸音粗,未闻及明显干湿性啰音;心率160次/分,心律齐,心音有力,未闻及病理性杂音;腹部膨隆,叩诊鼓音,无压痛、反跳痛,肝脾无肿大,肾区无叩击痛,

肠鸣音活跃;四肢活动可,双下肢及眼睑无浮肿;神经系统查体未见异常。

辅助检查:尿比重1.105,酸碱度6.50,尿糖+++ ,尿蛋白+,尿酮体阴性,尿NAG酶157U/L,尿β2微球蛋白67.13mg/L,尿蛋白定量1.44g/24H,尿钙0.99mmol/24H,生化示血糖5.6mmol/L,血酮体阴性,尿素9.13mmol/L,肌酐33umol/L,碱性磷酸酶782U/L,25羟维生素D3 15.41ng/mL,甲状旁腺激素69.11pg/mL,血氨 61.6uom/L,电解质:钙1.41mmol/L,磷 0.75mmol/L,氯105.2mmol/L,血气分析:PH: 7.06, HCO3-: 7.2mmol/L,阴离子间隙12.5mmol/L,尿有机酸分析报告回示:乳酸、丙酮酸-OX、3-羟基丁酸升高,串联质谱检查(干血片)提示:游离肉碱偏低,肾脏B超示双肾弥漫性病变;腕骨X线片示干骺端呈毛刷样改变。患儿家长拒绝行肾脏穿刺检查;甲状腺功能、自身免疫抗体、头颅及垂体MR未见异常,眼科会诊未发现角膜病变。

与家长沟通并签署知情同意后取患儿及父母静脉血各2mL后行全外显子测序检测提示CTNS复合杂合变异,其母为c.329+2T>C剪切突变,其父为c.582C>G(p.Tyr194Ter)无义突变,患儿家系桑格尔测序结果如图1。结合患儿病史、临床表现及实验室检查明确诊断肾病型胱氨酸病。确诊后予以患儿纠酸、纠正电解质紊乱,护肾,使用左卡尼丁,补充维生素D后患儿多饮、多尿、酸中毒症状明显好转,出院后对患儿进行随访,其病情平稳,随访内容如表1。

2 讨论

胱氨酸病是一种溶酶体储存疾病,其特征是溶酶体内胱氨酸的异常聚积,其发生与CTNS基因突变密切相关。CTNS基因位于17p13号染色体,全长23kb,由12个外显子组成,负责编码溶酶体上的胱氨酸转运蛋白^[2]。CTNS的整个基因片段均可能发

【第一作者】 袁博,男,主治医师,主要研究方向:儿童泌尿系统疾病。Email: 53709518@qq.com

【通讯作者】 袁博

生突变,包括但不限于错义、无义、插入、缺失突变。迄今为止,相关文献已报道了120多种致病突变,欧美各国突变率相对较高,其中英国的巴基斯坦族发病率最高,约1:3600,其次为法国和加拿大^[3];亚洲各国较低,而我国仅见少数报道。目前已报道的基因突变包括IVS6+1(delG)IVS8-1(delGT) 剪接缺失^[4]; c.696C>G杂合突变^[5]; c.969C>G纯和突变; c.477C>G杂合突变; c.274C>T、c.680A>T杂合突变^[6]; c.922G>A纯和突变^[7]。本例报道中的突变发生于我国哈萨克族,为本民族首例报道,其母为c.329+2T>C杂合剪切突变,其父为c.582C>G(p.Tyr194Ter)杂合无义突变,其父突变类型在东亚人群中尚未见报道。在所有的突变类型中,约90%的突变临床表现为婴儿肾病型,又称肾病型胱氨酸肾病。

胱氨酸转运蛋白是胱氨酸病的缺陷蛋白,它是一种H⁺驱动的溶酶体胱氨酸同向转运体,由367个氨基酸构成,包含7个跨膜区域,C端存在一个以酪氨酸为基础的靶向基序,使其定位于溶酶体膜^[8-9]。正常情况下,胱氨酸转运蛋白将溶酶体内的胱氨酸释放到胞质,使其被胞质内的还原物质还原^[10-12]。当CTNS基因发生突变时,溶酶体膜上的胱氨酸同向转运体功能发生障碍,溶酶体内的胱氨酸无法正常进入胞质,使胱氨酸晶体在肾脏、眼睛、内分泌腺体、神经肌肉等几乎全身组织、器官大量聚积,引起肾小管酸中毒、角膜病变、甲状腺功能减退、特发性颅高压、神经行为异常等多种疾病。肾脏表现尤其明显,主要病理表现为肾小球足细胞足突消失、多核足细胞增多^[13],导致局灶性和节段性的肾小球病变;近端小管刷状缘和内吞囊泡上表达过量巨球蛋白和立方蛋白,引发炎症反应,最终发生肾小管间质纤维化^[14-16]。近端小管功能障碍导致葡萄糖、蛋白质、氨基酸、电解质、磷酸盐等重吸收障碍,临床表现为糖尿、蛋白尿、低肉碱水平、代谢性酸中毒、低钙血症、低钠血症、低钾血症、低磷血症等。

肾病型胱氨酸病又称为婴儿型胱氨酸病,此类患儿常有生长发育落后和肾损伤表现,肾损伤又以范可尼综合征和肾功能衰竭为主要表现。婴儿型范可尼综合征多以营养不良、生长发育落后、贫血为首发表现,而后逐渐发展为肾性糖尿、蛋白尿、氨基酸尿、低钾血症、维生素D缺乏性佝偻病^[17]。国内文献报道的患儿多以生长发育迟缓、代谢性酸中毒、尿检异常、多饮多尿、佝偻病、电解质紊乱、角膜病变为主要临床表现。本例患儿以肾小管性酸中毒为首发表现,肾小管酸中毒多见于继发性疾

病,其中以肾脏疾病最为常见,其次便是范可尼综合征^[18],该患儿伴有低钾、低磷、低钠、蛋白尿、糖尿及佝偻病表现,符合范可尼综合征后期的临床表现特点,但患儿发病前生长发育未见明显异常,加之人们对肾小管酸中毒、范可尼综合征熟悉程度不够,对疾病的早期诊断造成了误导。因此提高临床医师对该病的认识,减少漏诊及误诊显得十分重要。

目前诊断胱氨酸病的方法主要有三种:1、检测白细胞中胱氨酸水平,这是现行诊断方法的“金标准”。2、进行CTNS基因检测,约95%可以发现基因突变,这是我国采取最多的确诊方式。3、裂隙灯检测角膜胱氨酸晶体,肾活检虽然不作为常规诊断手段,但当标本出现晶体时可指导诊断^[13]。另有研究表明,壳聚糖酶对临床筛查和治疗效果监测具有临床意义^[19]。

肾病型胱氨酸病的治疗多以对症治疗为主,其目的是维持体内的酸碱平衡及电解质水平正常,预防佝偻病,供给足够的营养,必要时激素替代治疗^[20]。维持胱氨酸消耗疗法是针对胱氨酸病的特异性治疗,常用的药物为速释半胱胺酒石酸,临床试验证实足量的半胱胺治疗可有效延缓终末期肾病的进展,但该药在我国并未上市,因此绝大多数患儿只能接受对症治疗。Rika Kluck等人对比了肾病型胱氨酸病与其他慢性肾病患儿的生长发育,发现两种疾病早期生长发育差异并不明显,随着疾病进展,肾病型胱氨酸病患儿腿长和躯干增长速度逐渐落后,造成这一结果的原因,除上述所说低钙、低钾、代谢紊乱,还与成骨细胞和破骨细胞缺陷有关,并且患儿体脂储存减少,这也部分解释了肾病型胱氨酸病患儿青春期成熟延迟,即使患儿接受了半胱胺消耗治疗、激素替代治疗,其生长发育仍可能低于正常^[21]。因此肾病型胱氨酸病患儿在症状好转后,应定期监测肾小管功能水平,注意患儿生长发育和营养状况。本例患儿在接受纠正酸碱平衡和电解质紊乱、补充维生素D等对症治疗后,病情明显好转,根据随访结果可知,患儿病情控制良好。但以上两种治疗方法都只能缓解症状,无法做到治愈,因此,基于基因改造的造血干细胞移植有望成为一种新的治疗方法^[22]。

研究表明,男性胱氨酸患者受孕率极低,而女性患者则可正常生育,但应被视为高危孕产妇。若父母双方仅一方携带致病基因,则患儿患病率较低,若父母双方均为致病突变基因携带者,则应在妊娠早期完成产前基因检测,从而有效预防该病的发生^[23]。

表1 随访表

随访时间	年龄	肌酐(umol/L)	尿素(mmol/L)	尿糖	尿蛋白	25羟维生素D3(nmol/L)	磷(mmol/L)	钙(mmol/L)
2022.2	1岁10月	27	4.8	+	+++	83.5	0.98	2.01
2022.4	2岁	36	3.2	+++	+	73	1.03	2.51
2022.6	2岁2月	42	8.0	++	++	62	0.82	1.94
2022.8	2岁4月	29	5.7	+	+	92.4	1.38	2.42
2023.1	2岁9月	46	9.6	+++	++	32.5	0.78	1.86
2023.2	2岁10月	33	5.9	+	++	102	1.26	2.37

图1 患儿及其父母CTNS基因测序图

(下转第15页)