Clinical Application Value of 3.0T MR in the Diagnosis of Ovarian Cystic Lesions*

YANG Rui, LIU An-lu, ZHAO Nian, et al., MRI room, Hubei Medical College Affiliated Dongfeng Hospital, Shiyan 442008, Hubei Province, China

论 著

3.0T MR在卵巢肿瘤诊断中的临床应用价值*

湖北医药学院附属东风医院影像科
(湖北 十堰 442008)

杨 锐 刘安陆 赵 年
闵 朋

【摘要】目的 分析3.0T MR鉴别诊断卵巢肿瘤患者的临床结果。**方法** 对2012年5月至2015年5月我院收治的40例卵巢肿瘤患者的临床资料进行回顾性分析。**结果** 40例患者中, 37例患者的鉴别诊断符合手术病理结果, 达到了92.5%的临床诊断符合率; 15例患者为单纯性卵巢囊肿, 8例患者为卵巢囊性畸胎瘤, 6例患者为卵巢囊腺瘤, 5例患者为卵巢子宫内位异位囊肿, 3例患者为卵巢囊腺癌, 3例患者为卵巢冠囊肿, 分别占总数的37.5%、20.0%、15.0%、12.5%、7.5%、7.5%。卵巢囊性畸胎瘤、黏液性囊腺瘤、浆液性囊腺瘤、卵巢冠囊肿的平均瘤体/囊肿直径分别为(12.5±3.3)cm、(10.5±3.5)cm、(10.2±3.3)cm、(14.3±3.4)cm。**结论** MR能够有效鉴别诊断卵巢肿瘤。

【关键词】 MR; 卵巢肿瘤; 鉴别诊断; 临床结果

【中图分类号】 R445.2; R737.31

【文献标识码】 A

【基金项目】 2014年十堰市科学技术研究与开发项目计划(项目编号: 14Y56)

DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2016.09.032

通讯作者: 闵 朋

[Abstract] Objective To analyze the clinical outcomes analysis of 3.0T MR in the diagnosis of patients with ovarian cystic lesions. **Methods** The clinical data of 40 cases of patients with ovarian cystic lesions who were treated in our hospital from May 2012 to May 2015 were retrospectively analyzed. **Results** Among the 40 cases of patients, 37 cases of patients were in the differential diagnosis in line with the results of pathology, the clinical diagnosis rate reached 92.5%, 15 cases of patients were with simple ovarian cysts, 8 cases of patients were with ovarian cystic teratoma, 6 cases of patients were with ovarian cystadenomas, 5 cases of patients were with ovarian endometriosis cysts, 3 cases of patients were with ovarian cystadenocarcinoma, 3 cases of patients were with ovarian cysts crown, accounting for 37.5%, 20.0%, 15.0%, 12.5%, 7.5%, 7.5% of the total, respectively. The average tumor /cyst diameters of ovarian cystic teratoma, mucinous cystadenoma, serous, crown cyst ovarian were (12.5±3.3) cm, (10.5±3.5) cm, (10.2±3.3) cm, (14.3±3.4) cm. **Conclusion** MR can effectively diagnose ovarian cystic lesions.

[Key words] 3.0T MR; Ovarian Cystic Lesions; Diagnosis; Clinical Outcomes

卵巢病变具有繁多的种类, 其中囊性病变占总数的60%~70%^[1], 缺乏典型的临床表现, 主要筛查手段为B超, 但是在一些情况下B超很难将病灶的性质及范围立体呈现出来^[2], 而MR具有较好的软组织对比度, 能够多方面成像, 因此在女性生殖系统的检查中得到了极为广泛的应用^[3]。为了将有效的影像学依据提供给临床对卵巢肿瘤的诊断和治疗, 本研究对2012年5月至2015年5月我院收治的40例卵巢肿瘤患者的临床资料进行回顾性分析, 分析了3.0T MR鉴别诊断卵巢肿瘤患者的临床结果, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机选取2012年5月至2015年5月我院收治的40例卵巢肿瘤患者, 所有患者均经手术病理证实为卵巢肿瘤, 均知情同意。患者年龄在28~65岁之间, 平均年龄为(41.6±3.5)岁。在临床症状方面, 33例患者有显著临床症状, 7例患者无显著临床症状, 其中显著临床症状主要包括下腹部坠胀感、腹部按压有包块等。

1.2 方法 检查前嘱咐患者对适度充盈的膀胱进行有效保持, 采用采用Philips ingenia3.0T超导磁共振扫描仪, 患者入室后让其取平卧位, 应该认真扫描从脐部到耻骨之间的全部范围。扫描过程中运用常规轴位、矢状位的TSE T1WI、TSE T2WI和脂肪抑制技术, 同时在必要的情况下对冠状位进行增扫, 增扫过程中严格依据患者的实际病情。有效设置扫描仪参数, T1WI中TR、TE、翻转角度分别设定为110~170ms、12ms、70°, T2WI中TR、TE分别设定为3000~5000ms、96~120ms, 扫描层厚、层间隔、扫描矩阵、扫描影像采集次数、影像视野分别设定为4mm、0.8mm、320×256、2~3次、23cm×23cm。同时在必要的情况下对患者进行增强扫描, 扫描过程中严格依据患者的实际病情, 扫描前给予患者静脉注射1mmol/kg扎喷酸葡胺。

1.3 观察指标 入选标准为卵巢肿瘤的病灶内液性成分在80%以上。同时对患者卵巢病灶部位的3.0T MR信号、形态等其他影像学征象进行认真观察和分析, 然后将其详细记录下来, 并将病变性质确定下来, 确定过程中严格依据阅片结果, 最后将其诊断结果和手术病理资料对比。

1.4 统计学处理 本次研究中数据的采集与处理均由笔者亲自完成, 并保证所有数据的真实与科学性。将已采集数据初步录入Microsoft Excel 2010校正, 使用SPSS22.0软件进行统计学分析, 3.0T MR诊断和病理临床符合例数和符合率计数资料以“%”形式录入, 结果采用 χ^2 检验; 结果检验水准以 $P>0.05$ 时, 两组数据差没有统计学意义。

2 结果

2.1 本组40例患者的影像学检查与手术病理组织结果比较 40例患者中, 经3.0T MRI诊断, 37例患者的鉴别诊断和手术后临床诊断相符, 临床诊断符合率为92.5%, 而病理和临床诊断符合率100%。将3.0T MRI诊断符合率和手术病理检查结果纳入统计学检验, 结果显示差异没有统计学意义($P>0.05$)。见表1。

2.2 卵巢肿瘤的3.0T MR表现 40例患者中, 15例患者为单纯性卵巢囊肿, 8例患者为卵巢囊性畸胎瘤, 6例患者为卵巢囊腺瘤, 5例患者为卵巢子宫内膜异位囊肿, 3例患者为卵巢囊腺癌, 3例患者为卵巢冠囊肿, 分别占总数的37.5%、20.0%、15.0%、12.5%、7.5%、7.5%。1)单纯性卵巢囊肿的3.0T MR表现为: 囊肿呈圆形, 囊肿内具有均匀的MR信号, 具有清晰的界限和完整的包

膜; 2)卵巢囊性畸胎瘤的3.0T MR表现为: 瘤体直径在5~20cm之间, 平均瘤体直径为(12.5±3.3)cm, 瘤体主要呈条带状、类圆形等, 短T1、长T2脂肪信号影像显示清晰; 3)卵巢囊腺瘤中1例患者为黏液性囊腺瘤, 2例患者为浆液性囊腺瘤, 分别占总数的2.5%、5.0%, 其中粘液性囊腺瘤的瘤体直径在20~30cm之间, 平均瘤体直径为(10.5±3.5)cm, 多房, 小房具有较为纤细的分隔且呈蜂窝状, 各个小房均具有不同的MR信号。浆液性囊腺瘤的MR表现为: 病灶具有偏低的T1信号和偏高的T2信号, 瘤体具有较薄的壁, 瘤体直径在8~12cm之间, 平均瘤体直径为(10.2±3.3)cm; 4)卵巢子宫内膜异位囊肿的3.0T MR表现为: 囊肿呈椭圆形, MR具有混杂

的信号, 囊体具有不同的大小, 具有不同厚薄的壁, 一些患者表现出复杂性多房结构; 5)卵巢囊腺癌的3.0T MR表现为: 瘤体呈乳头状结构, 周围具有模糊的边界, 病灶具有较为清晰的轮廓, 具有不均匀且混杂的T1、T2信号; 6)卵巢冠囊肿的3.0T MR表现为: 囊肿主要呈圆形、椭圆形, 囊肿直径在10~18cm之间, 平均囊肿直径为(14.3±3.4)cm, 液体信号影显著, 见表2、图1-3。

3 讨论

卵巢肿瘤属于一种妇科综合性病变, 在临床极为常见, 发生在女性卵巢区域。该病变会在很多因素的影响下发生, 由于该类病变临床症状并不典型, 因此

表1 3.0T MRI检查结果与病理组织检查结果临床符合率比较

组别	符合例数	不符合例数	符合率
3.0TMR (n=40)	37	3	92.5%
病理结果 (n=40)	40	0	100%
χ^2 值	3.078	3.017	-
P值	0.0793	0.077	-

表2 卵巢肿瘤的3.0T MR表现 (例/%)

卵巢肿瘤	分类	分布	平均瘤体/囊肿直径 (cm)
单纯性卵巢囊肿		15 (37.5)	-
卵巢囊性畸胎瘤		8 (20.0)	12.5±3.3
卵巢囊腺瘤		6 (15.0)	-
	黏液性囊腺瘤	1 (2.5)	10.5±3.5
	浆液性囊腺瘤	2 (5.0)	10.2±3.3
卵巢子宫内膜异位囊肿		5 (12.5)	-
卵巢囊腺癌		3 (7.5)	-
卵巢冠囊肿		3 (7.5)	14.3±3.4

图1 左侧: 卵巢腹膜包裹性囊肿。图2 左侧: 成熟囊性畸胎瘤。图3 双侧: 浆液性囊腺瘤, 右侧: 浆液性囊腺瘤。

临床很难对其进行有效的鉴别诊断^[4-8]。随着现代医疗技术的飞速发展和不断进步,影像学技术便成为临床对其进行诊断过程中主要依赖的手段,临床在鉴别诊断疑难疾病的过程中日益广泛地应用了MR技术^[9]。MR技术能够多方位成像,特别是对软组织病变具有较好的对比度,能够将卵巢的病变异常情况及正常解剖清晰显示出来,在定位和定性鉴别卵巢肿瘤的过程中准确度较高,因此说其在鉴别诊断卵巢肿瘤方面具有无比的优越性,同时还能够将重要的参考依据提供给临床对手术方案的制定^[10-12]。本研究表明,40例患者中,37例患者的鉴别诊断符合手术病理结果,达到了92.5%的临床诊断符合率,3.0T MR临床诊断符合率和病理比较经统计学检验显示差异没有统计学意义($\chi^2=3.078$, $P=0.0793$, $P>0.05$)。充分说明了临床在鉴别诊断卵巢肿瘤的过程中,应用3.0T MR能够将囊性肿块的形态、边缘等清晰显示出来,将清晰的影像资料提供给临床医师,准确定位定性囊性病变,从而将重要的依据提供给临床对针对性手术方案的制定。

相关医学学者研究表明,通常情况下,单纯性卵巢囊肿的3.0T MR表现为:囊肿呈圆形,囊肿内具有均匀的MR信号,具有清晰的界限和完整的包膜;卵巢囊性畸胎瘤的3.0T MR表现为:瘤体主要呈条带状、类圆形等,短T1、长T2脂肪信号影像显示清晰;卵巢囊腺瘤中粘液性囊腺瘤多房,小房具有较为纤细的分隔且呈蜂窝状,各个小房均具有不同的MR信号。浆液性囊腺瘤病灶具有偏低的T1信号和偏高的T2信号,瘤体具有较薄的壁;卵巢子

宫内膜异位囊肿的3.0T MR表现为:囊肿呈椭圆形,MR具有混杂的信号,囊体具有不同的大小,具有不同厚薄的壁,一些患者表现出复杂性多房结构;卵巢囊腺瘤的3.0T MR表现为:瘤体呈乳头状结构,周围具有模糊的边界,病灶具有较为清晰的轮廓,具有不均匀且混杂的T1、T2信号;卵巢冠囊肿的3.0T MR表现为:囊肿主要呈圆形、椭圆形,液体信号影显著。本研究结果还表明,40例患者中,15例患者为单纯性卵巢囊肿,8例患者为卵巢囊性畸胎瘤,6例患者为卵巢囊腺瘤,5例患者为卵巢子宫内异位囊肿,3例患者为卵巢囊腺瘤,3例患者为卵巢冠囊肿,分别占总数的37.5%、20.0%、15.0%、12.5%、7.5%、7.5%。卵巢囊性畸胎瘤、黏液性囊腺瘤、浆液性囊腺瘤、卵巢冠囊肿的平均瘤体/囊肿直径分别为(12.5±3.3)cm、(10.5±3.5)cm、(10.2±3.3)cm、(14.3±3.4)cm,和相关医学学者研究结果一致,充分证实了这一点。

总之,3.0T MR能够有效鉴别诊断卵巢肿瘤患者,值得在临床推广。

参考文献

- [1] 乐杰. 妇产科学[M]. 7版. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 283-285.
- [2] 杨莹, 张辉, 王效春等. 磁敏感加权成像在卵巢子宫内异位囊肿中的应用初探[J]. 中国药物与临床, 2013, 13(8): 1003-1005.
- [3] 白杰. 人附睾蛋白4及CA125联合检测在卵巢肿瘤中的应用及人附睾蛋白4水平与卵巢肿瘤病理学分型的相关性研究[J]. 中华妇幼临床医学杂志(电子版), 2015, (4): 458-461.
- [4] 赵娟. 多囊卵巢综合征助孕治疗研究进展[J]. 山西中医学院学报, 2010, 11(1): 67-69.
- [5] 张举. 68例卵巢肿瘤的CT诊断价值

分析[J]. 求医问药(下半月), 2012, 10(2): 520.

- [6] 翁小琳, 许建铭, 范觉昕, 等. 卵巢肿瘤的MR诊断与鉴别诊断[J]. 苏州大学学报(医学版), 2010, 30(4): 881-882.
- [7] 任明达, 刘树学, 唐玉德, 等. 卵巢肿瘤定性诊断及卵巢癌术前分期: MRI与病理对照研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2015, 22(4): 87-90.
- [8] 相世峰, 杨素君, 宋利宏, 等. 卵巢透明细胞癌的MRI表现[J]. 中国CT和MRI杂志, 2014, 14(9): 49-51.
- [9] Ashish P Wasnik, Christine O Menias, Joel F Platt, et al. Multimodality imaging of ovarian cystic lesions: Review with an imaging based algorithmic approach[J]. World J Radiology, 2013, 5(3): 113-125.
- [10] Ackerman S., Irshad A., Lewis M, et al. Ovarian Cystic Lesions. A Current Approach to Diagnosis and Management[J]. Radiologic Clinics of North America, 2013, 51(6): 1067-1085.
- [11] Matthias Barral, Philippe Soyer, Anthony Dohan, et al. Magnetic resonance imaging of cystic pancreatic lesions in adults: an update in current diagnostic features and management[J]. Abdominal Imaging, 2014, 39(1): 48-65.
- [12] Kotaro Sekiya, Memi Watanabe, Rohini N. Nadgir, et al. Nasopharyngeal Cystic Lesions: Tornwaldt and Mucous Retention Cysts of the Nasopharynx: Findings on MR Imaging[J]. Journal of Computer Assisted Tomography, 2014, 38(1): 9-13.

(本文编辑: 汪兵)

【收稿日期】2016-07-26