论 著

跨裂生长特性对中央型硬化性肺泡细胞瘤诊断的价值研究

1. 内蒙古赤峰学院附属医院CT室

(内蒙古 赤峰 024000)

2. 新疆维吾尔自治区人民医院米东

医院放射科 (新疆 乌鲁木齐 830000)

3. 武警新疆总队医院放射科

(新疆 乌鲁木齐 830091)

薛明团¹ 张 迎² 李诗瑞³

【摘要】目的 探讨跨裂生长特征对于中央型硬化性肺泡细胞瘤的价值研究。**方法** 回顾性分析经手术病理证实的10例跨裂生长的肺门旁占位,分析该特性在不同疾病中的影像表现。**结果** 10例结节中,7例为中央型硬化性肺泡细胞瘤(女性6例,男性1例,空气新月征3例,晕征4例)。1例腺癌,1例为结核球,1例为错构瘤,10例结节均有强化。**结论** 跨裂生长对于诊断中央型硬化性肺泡细胞瘤一定的特异性,有助于其正确诊断。

【关键词】 肺门旁占位; 硬化性肺泡细胞瘤; 跨裂

【中图分类号】 R445.4

【文献标识码】 A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-5131.2017.10.017

通讯作者: 薛明团

Study on the Diagnosis Value of the Cross Crack Growth Characteristics for Pulmonary Sclerosing Pneumocytoma of Central Type

XUE Ming-tuan, ZHANG Ying, LI Shi-rui. Department of CT Rom, Chifeng Institute Affiliated Hospital of Inner Mongolia, Chifeng 24000, Inner Mongolia, China

[Abstract] Objective To investigate the diagnosis value of the cross crack growth characteristics for pulmonary sclerosing pneumocytoma (PSP) of central type. **Methods** A retrospective analysis of 10 cases of pathologically confirmed cross crack growth of parahilar occupying, analysis of the characteristics in different disease manifestations of. **Results** Of the 10 cases, there were 7 cases of PSP of central type (female in 6 cases, male in 1 case, air crescent sign in 3 cases, halo sign in 4 cases). 1 case of adenocarcinoma, 1 case of tuberculoma, 1 case of hamartoma, 10 cases of nodular enhanced. **Conclusion** The cross section growth characteristic has a certain specificity in PSP of central type, which may help for definite diagnosis.

[Key words] Parahilar Occupying ; Pulmonary Sclerosing Pneumocytoma; Cross Crack

临床中经常遇到肺门旁占位性病变,则需要鉴别肺癌还是肺内良性病变,不同的诊断结果则会有不同的治疗手术方案,而有时候单纯通过观察肿瘤的境界、密度、强化方式等一般表现,尤其很多疾病具有共同的一些表现,比如肺错构瘤和硬化性肺泡细胞瘤(Pulmonary Sclerosing Pneumocytoma, PSP)均可有爆米花样钙化,则很难做出具体的诊断。本文回顾性分析10例跨裂生长的肺门旁占位,而硬化性肺泡细胞瘤则占了7例,笔者认为跨裂生长特性对于诊断PSP具有较强的特异性,以通过本文认识该征象,提高对PSP的诊断。

1 资料和方法

1.1 一般资料 收集我院在2013年1月~2016年7月期间手术确诊的肺门旁跨裂生长占位的10例临床资料。7例为中央型PSP,1例为男性,6例为女性。10例研究对象中,7例患者无任何临床症状,由体检中发现。2例患者胸痛、咳嗽入院;1例出现咳嗽、咳血:多数患者癌胚抗原、CYFRA21-1、NSE、SCC等肿瘤标记物检查均正常。

1.2 仪器与方法 10例患者均行胸部平扫、增强扫描,使用飞利浦(256排)螺旋CT扫描仪,扫描参数:管电压120KV,管电流240mA,螺距1.375,层厚及层距均为5mm,矩阵512×512;增强扫描:高压注射器注射非离子型对比剂碘海醇80ml,所得数据行1.0mm薄层重建,在飞利浦工作站行图像后处理。

所有图像均有我科2位主治医师以上共同观察,采集所需分析参数,如果两者意见一致则做出征象的描述结论,如两者意见不一致,则由副主任医师职称第三者读片,取两者意见一致者为征象描述。

2 结 果

2.1 CT表现 本组10例结节均表现为肺单发肿块。①一般征象:右肺6例,左肺4例,病灶均呈圆形、类圆形,平均直径约2.1cm。病

变边界清晰,多数密度均匀,呈软组织密度。3例可见点状钙化,2例为PSP,1例为错构瘤。所有结节增强扫描均有强化,轻中度强化4例,6例明显强化,其中明显强化结节中PSP占了5例,病灶局部明显强化CT值100Hu以上。

②“跨裂生长”:结节呈骑跨叶间裂生长,表现为结节范围超过一个肺叶向邻近肺叶生长。本组研究对象在横轴位均可见结节均有骑跨肺内叶间裂生长特性,在矢状位、冠状位观察更为显著,而PSP占了绝大多数(图1-2患者);

③其他征象:“空气新月征”:病灶边缘出现新月形空气影3例(图1-2);“晕征”:病灶周围见少许磨玻璃密度影例(图1-2);“贴面血管征”:病灶边缘可见血管断面影例。

3 讨论

3.1 病理及临床表现 硬化性肺泡细胞瘤是一种少见的肺内良性脑肿瘤,是由Liebon和Hubbell自1956年首先提出命名为肺硬化性血管瘤(Pulmonary Sclerosing Hemangioma, PSH),其没有特征性的临床表现,许多病例是由体检偶然发现,分中央型(肺门旁、段支气管周围)及周围型(段支气管以远)。文献报道发病率仅次于错构瘤^[1-2];组织学形态由实性区、乳头区、硬化区和血管瘤样区4种基本结构构成,绝大多数病变结构混合存在,只是各占比例有所不同^[3]。肺硬化性血管瘤以往命名多而混乱,WHO(2015)肺肿瘤组织学分类中将本病归到其他肿瘤中的腺瘤中,称为硬化性肺泡细胞瘤(PSP)^[4]。PSP多无特异临床表现,多由体检发现肺结节而就诊,少数病人可有咳嗽、胸痛、痰中带血等症

状。

3.2 CT影像表现 绝大多数PSP具有一般肺良性肿瘤的影像学特点。①一般情况:病灶均表现为单发类圆形实性结节影,边缘光滑,病灶大小不一,文献报道^[5]PSP以小结节多见,多数病灶直径小于3cm;本组中最小病灶约1.4cm,最大直径约5.3cm,平均直径约2.1cm,与文献相符。PSP密度常较均匀,少数可有砂砾状钙化。以往多把结节中含钙化灶的病例考虑为错构瘤或者结核球,从本组病例看,PSP也可以出现钙化,笔者认为钙化不能作为PSP的特异性征象,但可能是肺部良性肿瘤的有价值的征象。PSP为富血供肿瘤,有文献^[6-7]认为显著强化是PSP的最大特点,亦有文献^[8]认为肿瘤血管样强化对PSP具有支持诊断的意义,本组病例中PSP均有强化,且多数呈明显强化,甚至结节内局部强化CT值可大于100Hu,笔者以为明显强化对诊断较有特异性,亦符合相关文献描述。②“跨裂生长”:PSP与胸膜关系密切,病灶多位于叶间裂附近,尤其以中央型PSP为著。本组中有7例PSP具有跨叶间裂生长特性,是肿瘤突破叶间裂向邻近肺叶生长。有文献^[9]研

究19例患者中4例出现跨胸膜生长,并认为跨胸膜生长是其恶性倾向可能,但本组跨裂生长病灶中,病理显示均为良性,与其不甚相符;且有文献^[10]指出PSP可以引起淋巴结转移,属于低度恶性肿瘤,但本组病例中未出现淋巴结转移。本组研究中,对于肺门旁结节出现跨裂生长特性的,70%病理诊断为PSP,故笔者认为跨裂生长对于中央型PSP具有重要诊断价值,相应文献报道甚少,具体原理有待进一步研究。③其他特征:“空气新月征”:对于中央型PSP,冠状位上气体多位于肿瘤上方,且较明显;笔者认为此征象在中央型PSP中出现较多,对于诊断中央型PSP具较高特异性。“空气新月征”、“晕征”及“血管贴面征”等特性表现文献^[11-16]描述较多。

3.3 鉴别诊断 绝大多数PSP具有一般肺良性肿瘤的影像学特点,PSP主要需要与肺内孤立性结节或者肿块鉴别:①肺癌:多发生于中老年男性患者,与吸烟密切相关,临床症状多有痰中带血;而结节多有毛刺、分叶征,囊变坏死多见,增强扫描不均匀强化(强化幅度远不如PSP),峰值持续时间短,对周围血管是侵及

图1-3 PSP;左肺结节骑跨左肺斜裂生长(跨裂征:白色箭头)。冠状位(图2)、矢状位(图3)上结节上方见新月形低密度空气影(空气新月征:黑色箭头)、磨玻璃密度影(晕征)。图4-6 PSP;右肺结节骑跨左肺斜裂生长(跨裂征:白色箭头)。冠状位(图5)、矢状位(图6)上结节上方见新月形低密度空气影(空气新月征:黑色箭头)、磨玻璃密度影(晕征)。

牵拉,呈血管束征改变,而不是PSP的血管受压呈贴边征改变,且肺癌多可合并纵膈淋巴结转移等。②肺错构瘤:肺内最常见良性肿瘤,结节内可见脂肪成分和爆米花样钙化,比较有特征性征象。PSP虽可有钙化,但多数呈点状钙化。但本组病例中出现一例爆米花样钙化,术前亦诊断为错构瘤。错构瘤轻度或者无强化,且出现脂肪密度是其特征性征象。PSP明显强化。且错构瘤无晕征、空气新月征等征象。③结核球:有结核特定结合好发部位,双肺上叶尖后段、下叶背段,增强扫描多轻度强化,明显区别于PSP的明显强化特点。其周围卫星灶对诊断结核球更具有很高特异性。另外临床症状也不一样。④肺曲霉球:多有糖尿病、结核或长期卧床抵抗力低下等病史,影像上肺曲霉球也有空气新月征及晕征,需要与PSP鉴别。但是大多数曲霉球随体位变化而移动,增强扫描强化不明显。

综上所述,对于肺门旁单发结节,且多见于女性,无临床症状,边界清晰,密度较均匀,增强多明显强化,尤其延迟强化,

局部强化CT值大于100Hu。特殊表现如出现“跨裂生长”特性等特异性征象,则高度提示硬化性肺泡细胞瘤,我们应认识该特异性特点,有助于正确诊断此病,避免误诊误治。

参考文献

[1] 陈明, 查云飞, 王艳艳, 等. 肺硬化性血管瘤CT表现并文献复习[J]. 实用放射学杂志, 2015, 31(2): 336-338.
 [2] 于正伦, 张学习, 周思宇, 等. 肺硬化性血管瘤27例临床分析[J]. 中国医科大学学报, 2016, 45(6): 569-571.
 [3] 周伟询, 刘鸿瑞. 肺硬化性血管瘤的本质和组织来源[J]. 中华病理学杂志, 2004, 33(2): 168-170.
 [4] 张兵林, 笪翼平. WHO(2015)肺肿瘤组织学分类解读[J]. 诊断病理学杂志, 2016, 23(6): 401-405.
 [5] 梁波, 蔡培坤. 肺硬化性血管瘤的MSCT特征与病理分析[J]. 罕少疾病杂志, 2015, 22(1): 35-38.
 [6] 刘勇彬, 凌红玲, 陈淮, 等. 肺硬化性血管瘤CT强化特点及微血管密度的关系[J]. 实用医学影像杂志, 2014, 15(2): 77-79.
 [7] 钟月芳, 应碧伟, 王伟根, 等. 肺硬化性血管瘤的CT动态增强影像学表现[J]. 影像诊断与介入放射学, 2013, 22(4): 253-254.
 [8] 胡新如, 谭利华. 肺硬化性血管瘤的CT征象与临床病理研究[J]. 实用医学影像杂志, 2015, 16(2): 114-116.

[9] 王同兴, 孙晋, 谢光辉等. 肺硬化性血管瘤的MSCT诊断[J]. 中国医学计算机成像杂志, 2014, 20(4): 325-328.
 [10] 李兴荣, 李豪刚, 郭学军, 等. 肺硬化性血管瘤CT影像与病理对照研究[J]. 中国CT和MRI杂志, 2014, 12(2): 40-43.
 [11] 周涛, 潘爱珍, 高强, 等. 肺硬化性血管瘤的临床、病理及MSCT表现[J]. 放射学实践, 2015, 30(1): 37-40.
 [12] Yoshida K, Kurokawa K, Ouchi H, et al. A case of pulmonary sclerosing hemangioma with ground-glass opacity and emphysematous change[J]. Rinsho Hoshasen, 1999, 44(5): 623-626.
 [13] 况红妹, 龚洪翰, 彭德昌, 等. 肺硬化性血管瘤的CT表现(附10例报告)[J]. 放射学实践, 2014, 29(2): 166-169.
 [14] 周永, 努尔兰, 韩文广, 等. 肺硬化性血管瘤的CT表现及误诊分析[J]. 医学影像学杂志, 2016, 26(1): 36-39.
 [15] 胡爱民, 赵丹, 吕岩, 等. 肺硬化性血管瘤43例影像与病理诊断分析[J]. 中国医刊, 2016, 51(5): 33-36.
 [16] 刘芬, 方向军, 曾晔, 等. 肺硬化性血管瘤MSCT诊断及误诊分析[J]. 中国CT和MRI杂志, 2015, 13(10): 37-39.

(本文编辑: 唐润辉)

【收稿日期】2017-08-29

(上接第 32 页)

[6] 胡锦清, 沈建康, 凌华威, 等. 三维CT血管造影在脑动静脉畸形诊治中的初步应用经验[J]. 中华神经外科杂志, 2002, 18(3): 150-152.
 [7] 台立军, 王彦超, 肖久鑫. 64层CT诊断双肺多发肺动静脉畸形1例[J]. 中国CT和MRI杂志, 2009, 7(1): 72-72.
 [8] 郑春雨, 李铭山. 16层螺旋CT血管造影的临床应用[J]. 中国CT和MRI杂志, 2005, 3(3) 34-36.
 [9] 刘冰, 杨晓锋, 关晶, 等. MSCT平扫及

双期增强扫描对诊断肺硬化性血管瘤的意义[J]. 解放军医药杂志, 2015, 27(4): 85-88.
 [10] 王伟, 易蕊, 张媛媛, 等. 大型军事演习中创伤性骨折单螺旋CT三维重建的应用[J]. 解放军医药杂志, 2015, 27(6): 94-97.
 [11] 李建荣, 陈铮立, 王胜虎, 等. CTA在出血性脑动静脉畸形救治中的应用价值[J]. 中华神经医学杂志, 2011, 10(9): 948-949.
 [12] 张文兰, 马晓民, 金娟. CT, DSA和MRI诊断脑动静脉畸形[J]. 中国医

学影像学杂志, 2005, 13(4): 310-313.
 [13] 汪五全, 刘心, 何金年. CTA, MRA诊断脑动静脉畸形: 与DSA比较[J]. 中国介入影像与治疗学, 2012, 9(12): 854-857.

(本文编辑: 唐润辉)

【收稿日期】2017-08-22